



FICHE EXPLICATIVE FIBROSCOPIE BRONCHIQUE EN ARABE

- فحص القصبة الرئوية بواسطة أنبوب -

فحص القصبة الرئوية؛ هو فحص يسمح بكشف شُعّبك الرئوية (بحث عن إلتهاب).

- ما هو هذا؟

- الفحص يدوم حوالي عشرة دقائق، حيث يقوم الطبيب بإدخال أنبوب مرن وبحجم صغير في الأنف والأذن أو الفم وذلك بعد وضع (SPRY) في الأنف للتثبيت. هذا الأنبوب ينزل لغاية القصبة حيث يتم أخذ عينة إذا رأى الطبيب ضرورة بذلك. إما إستنشاق عادي لإفرازات القصبة، أو إستنشاق بعد أن يحقن بالماء المعقم في القصبة. (هذا ما نسميه غسل القصبة التجويفي) إما بوخر إبرة (سحب عينة صغيرة من القصبة).

- تعقيبات

- الأكثر شيوعاً

- سعال الذي يتوقف عند إنتهاء الفحص

- زيادة في صعوبة التنفس : عنها يعطى لكم الأوكسجين كي يتم التنفس بطريقة أفضل.

- نزيف (من الأنف أو الفم إذا كان هناك أخذ عينة) والذي يتوقف صدفة في أكثر الحالات.

- حرارة مرتفعة بعد ساعات من الفحص. في هذه الحالة إستشر الطبيب في حال استمرت لأكثر من 12 ساعة.

- نوادر كثيرة :

- رد فعل حساسية أو بنجية

- إلتهابات.

إحتياطات.

قبل الفحص

- إجباري أن يكون الشخص على الريق قبل 6 ساعات من بدئه

- (تجنب العلكة والمشروبات مع إمكانية شرب قليل من الماء)

- يطلب إلى المدخنين التوقف عن التدخين 48 ساعة قبل بدء الفحص وبعض الساعات بعد الفحص.

- إذا كنت قلقاً، بلغ الطبيب بذلك كي يعطيك دواء للإسترخاء.

- لا يتم إجراء الفحص ببنج عام ؛ لأنه في هذه الحالة يجب أن تدخل المستشفى للعلاج.
- أثناء الفحص.
- الفحص سيكون سهلاً إذا كنت مسترخياً وواثقاً ؛ الطبيب والممرضات هم موجودون هنا للإجابة على أسئلتك.
- بعد الفحص.
- مهم : إبقي على الريق لمدة ساعتين لأن البنج الذي تلقيته يمكن أن ينجر في طريق غير صحيح.
- تجنب القيادة لمدة ساعات في حال تناولت دواء للاسترخاء.
- في حال حدوث وخز بالإبرة وإذا كان هناك بزاق مع الدم بكمية كبيرة ؛ عندها يجب إبلاغ الطبيب سريعاً.

قبل الفحص سيطلب منك التوقيع على استماراة تشرط بأنك تلقيت المعلومات.

- معلومات مفيدة قبل الفحص

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل تدخن ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل عندك حساسية ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل تأخذ علاج ضد تجميد الدم ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل عندك جهاز تبديل أسنان ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل عندك مشكلة تجميد الدم ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل عندك مشكلة في أمراض القلب : (جلطة ، إلتهاب شريانی) ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل عندك مشكلة في التنفس : (ربو) ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - هل عندك حرارة اليوم ؟ |
| نعم <input type="checkbox"/> | لا <input type="checkbox"/> | - للنساء : هل أنت حامل ؟ |
| - للعلم : | | |

- تعديل العلاج قبل فحص القصبة الرئوية (للتنذير، هذا سيكون موصوف أو محدد من قبل طبيبك).
- فقط إذا كان متوقعاً الغسيل : لا يتوجب أخذ الدم في غياب سابقة معنية : لا تعديل للعلاج المعتمد (الحالة الأكثر تكراراً).
- إذا كان هناك أخذ عينة متوقعة : أخذ الدم لمعرفة نسبة شرائح الدم : T.P، TCA إذا كان هناك عوامل خطر (مثلاً : مشكلة كبد أو مشكلة قلبية. + متابعة ممكنة لدواء KARDEGIC 500 mg
- توقف :

- أ أيام قبل الفحص PLAVIX -
- INR<1.5 AVK -
- HBPM - قبل وحسب نصف حياته.
- ضد تجميل الدم مجدداً قبل خمسة أيام.